

## Уважаемые коллеги!

Вам предлагаются два блока заданий:

№1 – №7. «Математический» (задачи для решения).

№8 – №12. «Методический» (задания, моделирующие работу учителя).

Среди предложенных заданий есть и достаточно трудные; присылайте Ваши решения, даже если Вам не удалось выполнить некоторые из них. Единственное условие — в работе должны быть представлены задания из обоих блоков.

*Желаем успеха!*

*Жюри конкурса*

### I. Математический блок

1. Коэффициенты квадратного уравнения  $ax^2 + bx + c = 0$  удовлетворяют условию  $2a + 3b + 6c = 0$ . Докажите, что это уравнение имеет корень на промежутке  $(0; 1)$ .
2. Докажите, что при  $0 < x < \frac{\pi}{2}$  выполняется неравенство  $2^{\sin x} + 2^{\operatorname{tg} x} \geq 2^{x+1}$ .
3. Вычислите  $\left[ \sqrt{2} + \sqrt[3]{\frac{3}{2}} + \sqrt[4]{\frac{4}{3}} + \dots + \sqrt[2009]{\frac{2009}{2008}} \right]$  (здесь  $[x]$  — целая часть числа  $x$ , т.е. наибольшее целое число, не превосходящее  $x$ ).
4. Решите в целых числах уравнение  $2^x = 3^y + 1$ .
5. Докажите, что  $[\sqrt{n} + \sqrt{n+1}] = [\sqrt{n} + \sqrt{n+2}]$  для каждого натурального числа  $n$  (здесь  $[n]$  — целая часть числа  $n$ , т.е. наибольшее целое число, не превосходящее  $n$ ).
6. Отрезок делит треугольник на две новые фигуры с равными периметрами и площадями. Докажите, что центр вписанной в треугольник окружности лежит на этом отрезке.
7. Все грани тетраэдра — треугольники, длины сторон которых равны  $a$ ,  $b$  и  $c$ . Найдите объем тетраэдра.

## II. Методический блок

А. Ниже приводятся решения двух задач (№№8,9). Оцените каждое из решений и полученные ответы. Укажите все ошибки и недочеты.

8. Найдите все значения параметра  $a$ , при которых уравнение  $(a - 5 + |x + 1|)(a - x^2 - 2x) = 0$  имеет ровно два корня.

*Решение.* Уравнение  $(a - 5 + |x + 1|)(a - x^2 - 2x) = 0$  равносильно совокупности двух уравнений  $a - 5 + |x + 1| = 0$  и  $a - x^2 - 2x = 0$ .

Исследуем сначала первое уравнение:

$a - 5 + |x + 1| = 0 \Leftrightarrow |x + 1| = 5 - a$ . Это уравнение имеет два корня при  $a < 5$ , один корень,  $x = -1$ , при  $a = 5$  и не имеет корней при  $a > 5$ .

Выясним теперь, сколько корней имеет уравнение  $a - x^2 - 2x = 0$  в зависимости от  $a$ :  
 $a - x^2 - 2x = 0 \Leftrightarrow x^2 + 2x + 1 = a + 1 \Leftrightarrow (x + 1)^2 = a + 1$ .

Очевидно, это уравнение имеет два корня при  $a > -1$ , один корень,  $x = -1$ , при  $a = -1$  и не имеет корней при  $a < -1$ .

Таким образом, данное уравнение имеет ровно два корня при  $a < -1$  и при  $a > 5$ .

*Ответ:*  $a \in (-\infty; -1) \cup (5; +\infty)$ .

9. Решите уравнение  $\sqrt[3]{x^2 + 2x} + \sqrt[3]{3x^2 + 6x - 4} = \sqrt[3]{x^2 + 2x - 4}$ .

*Решение.* Сделаем замену  $t = x^2 + 2x$ . Так как  $3x^2 + 6x - 4 = 3t - 4$ , то исходное уравнение принимает вид  $\sqrt[3]{t} + \sqrt[3]{3t - 4} = \sqrt[3]{t - 4}$ . Далее имеем:

$$\begin{aligned} \sqrt[3]{t} + \sqrt[3]{3t - 4} = \sqrt[3]{t - 4} &\Leftrightarrow t + 3t - 4 + 3\sqrt[3]{t(3t - 4)}(\sqrt[3]{t} + \sqrt[3]{3t - 4}) = t - 4 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \sqrt[3]{t(3t - 4)} \cdot \sqrt[3]{t - 4} = -t &\Leftrightarrow t(3t - 4)(t - 4) + t^3 = 0 \Leftrightarrow t(t - 2)^2 = 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \begin{cases} t = 0, \\ t = 2. \end{cases} \end{aligned}$$

Таким образом, либо  $x^2 + 2x = 0$ , откуда  $x = 0$ ,  $x = -2$ , либо  $x^2 + 2x - 2 = 0$ , откуда  $x = -1 \pm \sqrt{3}$ .

*Ответ:*  $\{-2; 0; -1 - \sqrt{3}; -1 + \sqrt{3}\}$ .

Б. Решите задачи №№10,11,12 возможно большим числом способов (различными считаются способы, использующие различные математические идеи, а также различные технические приемы реализации одной и той же идеи). Укажите место каждого из использованных Вами способов решения в школьном курсе математики.

10. Докажите неравенство  $a^2 + b^2 + c^2 \leq 9R^2$ , если  $a, b, c$  — длины сторон треугольника  $ABC$ , а  $R$  — радиус описанной около этого треугольника окружности.

11. Найдите все значения  $b$  такие, что уравнение  $a^{2-2x^2} + (b+4)a^{1-x^2} + 3b+4 = 0$  не имеет решений ни при каком  $a > 1$ .

12. Середина каждой стороны основания четырехугольной пирамиды соединена отрезком с точкой пересечения медиан противоположной боковой грани. Докажите, что: а) эти отрезки пересекаются и точкой пересечения делятся в отношении 3:2, считая от стороны основания; б) середины этих отрезков являются вершинами параллелограмма. Найдите отношение площади этого параллелограмма к площади основания пирамиды.